



## ARMADILHAMENTO PRÉ-SAFRA

### Projeto Fitossanitário do Bicudo-do-Algodoeiro Safras 2017/2018 e 2018/2019



### PROJETO FITOSSANITÁRIO DO BICUDO-DO- ALGODOEIRO SAFRAS 2017/2018 E 2018/2019

**URUCUI – PIAUI** – Contato: 89 3544-3089  
Rua Sol Nascente, 10 – QM Lote 10 – Lot. Novo Horizonte  
CEP 64.860-000

**TERESINA – PIAUÍ** – Contato: 86 3221-7100  
Av. Jockey Club, 299, Ed. Euro Business - Sala 1001  
CEP: 64049-240



[www.apipa.com.br](http://www.apipa.com.br)

## PLANEJAMENTO ARMADILHAMENTO

As armadilhas serão instaladas pelo técnico da Apipa em conjunto com a fazenda, assim como as coletas de informações que deverão ser programadas ao longo das semanas e anotadas em planilha específica.

Quanto à época de armadilhar, a recomendação é realizar o armadilhamento 30 dias (ou 4 semanas) antes da data prevista para a semeadura do algodão nos talhões em cada fazenda. As armadilhas devem ser instaladas ao redor dos talhões que serão plantados com algodão na safra a uma distância não superior a 6 metros além de onde será a última linha da cultura e atentar para que máquinas e implementos não danifiquem as armadilhas.

As armadilhas, de acordo com a recomendação, devem permanecer até a fase B1. Após esse período, a fazenda deve retirar as armadilhas do campo e guardar em local adequado para posterior uso das mesmas.

Com as informações geradas no armadilhamento de pré-safra será possível detectar a presença ou não de bicudos nos talhões (fazenda). Com essas informações, o produtor terá a possibilidade de se anteceder e realizar as aplicações preventivas conforme o número BAS (Bicudo por Armadilha por Semana) ao surgimento dos primeiros botões florais na lavoura.

De acordo com a Abapa - Associação Baiana dos Produtores de Algodão ([www.abapa.com.br](http://www.abapa.com.br)), a recomendação quanto a distância entre as armadilhas varia entre 150 e 300 metros uma da outra, para talhões com mais de 50 há.

## APLICAÇÕES DE INSETICIDAS – EM B1

Ao surgimento dos primeiros botões florais, é importante realizar as aplicações levando em consideração o número BAS levantado no armadilhamento pré-safra.

## APLICAÇÕES NAS BORDADURAS DA LAVOURA

Ainda de acordo com a **Abapa**, com a finalidade de evitar o estabelecimento do bicudo na lavoura, recomenda a aplicação de inseticidas a partir do estágio V2 (segunda folha verdadeira) até o aparecimento da primeira maçã firme com uma frequência de aplicações a cada 5 dias e no caso de locais com pressão maior de bicudo, encurtar para menos dias (4-4 ou até 3-3 dias). Usar uma faixa de 40 metros de largura (locais de maior captura de bicudo, aumentar a faixa).

### Planejamento para Armadilhamento:

Primeira quinzena de Outubro: programação das fazendas junto ao técnico da Apipa para realizar o armadilhamento.

Primeira quinzena de Novembro: Início do armadilhamento nas fazendas, de acordo com a programação anterior.

## ZONEAMENTO

Índice de captura de bicudo por armadilha, cor do talhão e decisão a ser tomada:

Número BAS	Cor do Talhão	Número de Aplicações
Zero	Verde	0
0 a 1	Azul	1
1 a 2	Amarelo	2
Maior que 2	Vermelho	3

Vazio Sanitário Algodão: **15 de Agosto a 15 de Outubro**

Janela de Plantio Ideal: **10 de Dezembro a 10 de Janeiro**